

4. Übung zur Quantenmechanik

2. Mai 2018

Spin-Präzession

Der Hamiltonoperator für ein ortsfestes Elektron (mit Energie ε , Ladung e und Masse m) in einem zeitlich konstanten und räumlich homogenen Magnetfeld \vec{B} ist

$$H = \varepsilon \mathbf{1} - \frac{e\hbar}{2mc} \vec{\sigma} \vec{B} \quad (1)$$

in der Basis mit $|1\rangle$ für Spin nach oben und $|2\rangle$ für Spin nach unten.

Die Observable für die Messung des Spins in Richtung \vec{n} mit $|\vec{n}| = 1$ ist

$$S(\vec{n}) = \frac{1}{2} \vec{n} \vec{\sigma}. \quad (2)$$

4.1 Zeitentwicklungsoperator

1. Berechnen Sie die Lösung der Schrödingergleichung für den Zeitentwicklungsoperator $U(t, t_0)$

$$i\hbar \frac{d}{dt} U(t, t_0) = H U(t, t_0) \quad (3a)$$

$$U(t_0, t_0) = \mathbf{1} \quad (3b)$$

mit H aus (1) als 2×2 -Matrix.

2. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, das System zum Zeitpunkt $t \geq 0$ im Zustand $|2\rangle$ anzutreffen, wenn es zum Zeitpunkt $t = 0$ im Zustand $|1\rangle$ gestartet ist.
3. Berechnen Sie den Erwartungswert für eine Messung des Spins in Richtung \vec{n} zum Zeitpunkt $t \geq 0$, wenn das System zum Zeitpunkt $t = 0$ im Zustand $|1\rangle$ gestartet ist.
4. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, zum Zeitpunkt $t \geq 0$ entlang der Richtung \vec{n} den Spin $+1/2$ zu messen, wenn zum Zeitpunkt $t = 0$ der Spin $+1/2$ entlang der Richtung \vec{n}_0 gemessen wurde.
5. Wie vereinfacht sich das Ergebnis, wenn zwei oder alle der Vektoren \vec{B} , \vec{n} und \vec{n}_0 parallel sind?

4.2 Bloch-Sphäre / Energieerhaltung

Wir haben in der Vorlesung gesehen, daß ein Zustand $|\psi\rangle$ mit

$$|\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2}(\mathbf{1} + \vec{\sigma}\vec{n}) \quad (4)$$

auch durch einen Punkt \vec{n} auf der Oberfläche der Bloch-Sphäre $|\vec{n}| = 1$ beschrieben werden kann. Damit kann auch die Zeitabhängigkeit eines Zustands $|\psi(t)\rangle$ durch die Zeitabhängigkeit eines Punktes $\vec{n}(t)$ auf der Oberfläche der Bloch-Sphäre beschrieben werden.

1. Berechnen Sie den Erwartungswert der Komponenten des Spin-Operators

$$E_{\vec{n}}(S_i) = \langle\psi|S_i|\psi\rangle \quad (5)$$

für den Zustand, der dem Punkt \vec{n} auf der Bloch-Sphäre entspricht.

2. Berechnen Sie den Erwartungswert des Hamiltonoperators

$$E_{\vec{n}}(H) = \langle\psi|H|\psi\rangle \quad (6)$$

für den Zustand, der dem Punkt \vec{n} auf der Bloch-Sphäre entspricht.

3. Wir wissen aus dem Ehrenfest-Theorem, daß

$$E_{\vec{n}(t)}(H) = \text{const.} \quad (7)$$

gelten muß. Was folgt daraus für die Bewegung von $\vec{n}(t)$? Genügt die Information um die Bewegung bei gegebener Anfangsbedingung eindeutig festzulegen?

4. Berechnen Sie $\vec{n}(t)$ mithilfe des Zeitentwicklungsoperators (vgl. Aufgabe 4.1) für den Hamiltonoperator H aus (1) als Funktion des Anfangszustands $\vec{n}(0)$.
5. Wie vereinfacht sich die Rechnung, wenn die Vektoren \vec{B} und $\vec{n}(t)$ parallel sind?
6. Verifizieren Sie, daß Ihre Lösung tatsächlich

$$E_{\vec{n}(t)}(H) = \text{const.} \quad (8)$$

erfüllt.